

## VERMITAN 10%

### Compoziție

Albendazol ..... 10 g  
Excipient până la ..... 100 ml

### Proprietăți

Albendazol este un din substanțele cu cel mai larg spectru antihelmintic. Este deopotrivă activ asupra nematodelor (atât formele adulte cât și cele tinere), cestodelor (ambele capete și asupra segmentelor) și a trematodelor (numai formele adulte). Are de asemenea acțiune ovocidă și deci reduce cobtaminarea la pășune.

### Indicații

Ovine, caprine, bovine, rumegătoare sălbatice:

Vermitan 10% este folosit pentru combaterea următoarelor grupe de endoparaziți:

- Nematode gastrointestinale: *Haemonchus spp*, *Ostertagia spp*, *Trichostrongylus spp*, *Strongyloides spp*, *Bunostomum spp*, *Cooperia spp*, *Nematodirus spp*, *Chabertia spp*, *Osophagostomum spp*, *Toxocara spp*.
- Nematode pulmonare: *Dictyocaulus spp*, *Protostrongyloidea spp*
- Tenii: *Moniezia*
- Trematode adulte: *Dascioloa spp*, *Dictocoelium spp*
- *Varestrongylus spp*, *Elaphostrongylus spp*.

### Mod de administrare și doze

Suspensia Vermitan 10% se administrează oral.

#### Bovine:

Doza generală: 7,5 ml/ 100kg greutate corporală (7,5 albendazol/ 1 kg greutate corporală)

Pentru tratament suplimentar împotriva formelor adulte de trematode și a formelor de iarnă de *Ostertagia*, doza va fi 10 ml/100 kg greutate corporală (10 mg albendazol/ 1 kg greutate corporală).

#### Caprine, ovine:

Doza generală: 0,5 ml/ 10 kg greutate corporală (5 ml albendazol/ 1 kg greutate corporală)

Pentru tratamentul împotriva formelor adulte de trematode și a infecției *Protostrongyloidea*, doza va fi de 0,75 ml/10 kg greutate corporală (7,5 ml albendazol/ 1 kg greutate corporală (7-10 mg albendazol/ 1 kg greutate corporală)

### Precauții

Animalele aflate în prima treime a gestației nu trebuie tratate cu Vermitan 10%. Femeile gravide și copiii nu trebuie să intre în contact cu acest medicament. Preparatul nu este recomandat împotriva fasciolezei acute.

Agitați flaconul înainte de întrebuițare!

### Efecte secundare

Datorită toxicității sale reduse asupra mamiferelor, nu se constată efecte secundare, chiar la doze de 3-5 ori mai mare.

### Contraindicații

Nu se cunosc.

### Perioada de așteptare

Pentru carne și organe: 7 zile.

Pentru lapte: 60 de ore.

### Păstrare

Bidoane de plastic de 1 L și de 5 L.

### Valabilitate

3 ani.

### Număr autorizație de comercializare

040086-11.06.20004

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR.

### Producător:

Ceva Sante Animale.