

Vetmedin 5 mg Comprimate masticabile pentru câini

1. COMPOZITIE

1 comprimat masticabil conține:

Substanță activă:

Pimobendan 5 mg

Excipienți:

Povidona

Lactoza monohidrat Amidon de porumb Croscanneloza sodica Acid citric anhidru

Aroma artificiala de carne de vita, pulbere Dioxid de siliciu coloidal, anhidru

Stearat de magneziu

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vetmedin 5 mg comprimate masticabile pentru câini Pimobendan.

Comprimate ovale, divizibile, de culoare maronie marmorata cu pete albe fine, imprimate în relief cu simbolul Boehringer Ingelheim.

Comprimatul poate fi divizat în două părți egale.

3. DECLARAREA SUBSTANTEI ACTIVE SI A ALTOR INGREDIENTE

Un comprimat masticabil conține: Substanța activă(e): Pimobendan 5 mg

4. INDICATIE (INDICATII)

Tratamentul insuficienței cardiace congestive la câine, cu origine în cardiomiopatia dilatativă sau insuficiența valvulară (mitrală și/sau regurgitarea tricuspida).

5. CONTRAINDICATII

Nu trebuie utilizat în cazuri de cardiomiopatie hipertrofică sau condiții clinice în care o creștere a randamentului cardiac nu este posibilă, din cauze funcționale sau anatomice (de exemplu stenoza aortică). Deoarece pimobendanul este metabolizat în principal în ficat, nu trebuie utilizat la câini cu disfuncție hepatică Severă (vezi și Atenționari speciale).

6. REACTII ADVERSE

Un efect cronotrop pozitiv moderat și vomă pot apărea în cazuri rare.

Totuși, aceste efecte sunt dependente de doză și pot fi evitate prin reducerea dozei în aceste cazuri. În cazuri rare, s-a observat diaree tranzitorie, anorexie sau letargie.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 animal, dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10000 animale, inclusiv rapoartele izolate).

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII TINTA

Câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI), MOD DE ADMINISTRARE

Pentru administrarea pe cale orala, In doze de la 0,2 mg la 0,6 mg pimobendan per kg de greutate corporala pe zi. Doza zilnica recomandata este de 0,5 mg pimobendan per kg greutate corporala. Doza trebuie s fie Impartlta In doua administrari (0,25 mg l kg fiecare), ojumatate din doza de dimineata si cealalta jumatate la aproximativ 12 ore mai tarziu.

Fiecare doza trebuie administrata cu eel putin o ora Inainte de hranire.

9. RECOMANDARI PRNIND ADMINISTRAREA CORECTA

Vetmedin comprimate masticabile poate fi combinat cu un tratament diuretic, cum ar fi furosemid.

10. TIMP DE ASTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se pastra la temperaturi peste 25 ° C.

A se pastra flaconul bine inchis pentru a se proteja de umiditate. A nu se utiliza dupa data expirarii marcata pe cutie si flacon.

A nu se lasa la vederea si indemana copiilor.

12. ATENTIONARE(RI) SPECIALA(LE)

Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale.

In caz de ingerare accidentala, solicitati imediat sfatul medicului i prezentati acestuia prospectul sau eticheta produsului. Spalati-va pe maini dupa utilizare.

Utilizarea in perioada de gestatie,lactatie sau in perioada de ouat.

In studiile cu sobolani si iepuri pimobendanul nu a avut nici un efect asupra fertilitatii. Efecte embriotoxice s-au produs numai la doze maternotoxice in experimentele pe sobolani s-a demonstrat ca pimobendanul se excreta in lapte. Administrati la catelele gestante si care alapteaza numai in conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuata de medicul veterinar responsabil (vezi, de asemenea capitolul Contraindicatii).

13. PRECAUTII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate in ape reziduale sau resturi menajere. Solicitati medicului veterinar informatii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste masuri contribuie la protectia mediului.

14. ALTE INFORMATII

Dimensiunea ambalajului: 50 comprimate masticabile

Pentru orice informatii despre acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Animal Health Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel.: +43 (0) 1 80 105 0