

Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg

tablete pentru câini

Compoziție

O tabletă conține:

Substanțe active:

Febantel	150.0 mg,
Pirantel embonat	144.0 mg,
Praziquantel	50.0 mg;

Excipienți:

Amidon de porumb, Lactoză monohidrat, Celuloză microcristalină, Povidonă, Stearat de magneziu, Lauril sulfat de sodiu, Bioxid de siliciu coloidal anhidru, Aromă artificială de vacă, iradiată.

Indicații

Antiparazitar cu spectru larg pentru tratamentul câinilor infestați cu viermi rotunzi și viermi lați.

Viermi rotunzi:

Ascarizi	<i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonine</i> ,
Viermi cu cârlig	<i>Uncinaria stenocephala</i> ; <i>Ancylostoma caninum</i> ,
Viermele bici	<i>Trichuris vulpis</i> ;

Tenii (viermi lați):

Echinococcus granulosus,
Echinococcus multilocularis,
Dipylidium caninum,
Taenia spp.,
Multiceps multiceps,
Mesocestoides spp.

Contraindicații

Drontal Plus nu se utilizează în timpul primelor două treimi ale gestației.

A nu se utiliza simultan cu compuși care conțin piperazină.

Reacții adverse

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Câini.

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare și mod de administrare

Doza recomandată este de 15 mg febantel, 14,4 mg pirantel embonat și 5 mg praziquantel / kg greutate vie. Aceasta corespunde la 1 tabletă Drontal Plus pe 10 kg greutate vie.

Administrarea dozei corecte este specificată în următorul tabel, ca un tratament cu o singură administrare orală.

pentru Câini*	
Greutatea corporală (Kg)	Numărul de tablete
0,5 - ≤ 2	1/4
2 -≤ 5	1/2
5 -≤ 10	1
10 -≤ 15	1 1/2
15 -≤ 20	2
20 -≤ 25	2 1/2

*25 kg < Pentru câinii de talie mare ar trebui să utilizați tablete corespunzătoare

Recomandări privind administrarea corectă

Pentru administrare orală.

Tabletele pot fi administrate direct câinilor. Nu sunt necesare măsuri dietetice (înfometare) înainte sau după tratament.

Se recomandă ca tratamentul să se efectueze înainte de hrănire. Câinii pot înghiți tableta datorită gustului aromat.

Pentru deparazitări periodice ale câinilor adulți aceștia vor fi tratați la fiecare 3 luni. Pentru tratament de rutină o singură doză este recomandată. În caz de infecții grave cu nematode, se repetă doza după 14 zile.

Timp de așteptare

Nu este cazul.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie {EXP}.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: Orice tabletă utilizată parțial trebuie aruncată.

Atenționare specială

Orice tabletă utilizată parțial trebuie aruncată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pentru o bună igienă, persoanele care administrează tableta direct câinelui sau o încorporează în hrană, trebuie să se spele pe mâini după aceea.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Drontal Plus nu se utilizează în timpul primelor două treimi ale gestației.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Doze de 10 (zece) ori mai mari decât doza recomandată de Drontal Plus au fost tolerate fără semne de afectare a câinilor și cățelilor.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Alte informații**Natura și compoziția ambalajului primar**

Cutie de carton cu 6 sau 102 tablete.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Deținătorul Autorizației de Comercializare

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania