

Synoquin Cat

supliment articular pentru pisici

1. DENUMIREA PRODUSULUI

Synoquin cat

2. INGREDIENTE PER TABLETĂ

Glucozamină HCl 99%	225 mg
Sulfat de condroitină 95%	95 mg
Dexahan (Concentrat Hidrolizat de Proteină de Krill)	95 mg
Acid Ascorbic	22 mg
Sulfat de Zinc	15 mg

Constituenți analitici (%W/W): proteină brută 30, Cenușă 8.6, Grăsime Brută 4.6, Fibră Brută <0.10

3. COMPOZIȚIE

Glucozamină HCl, Făină De Orez Brun, Gelatină de Porc, Sulfat de Condroitină de Sodiu, Dexahan (Concentrat de Proteină Hidrolizată de Krill), Stearat de Magneziu

ADITIVI (PER KG): Vitamine: Vitamina C (Acid ascorbic E300) 30300mg. Microelemente: Sulfat de Zinc Monohidrat (E6) 21100 mg

4. INDICAȚII

Synoquin Efa este recomandat pentru managementul și tratamentul problemelor articulare la pisici. Este recomandat în osteoartrită și procese degenerative ale cartilajelor articulare, la pisicile ce au suferit traumatisme sau leziuni la nivel osteo-articular, post-chirurgical în intervenții ce au implicat articulațiile, post artroscopie și la pisicile cu vârste înaintate pentru prevenirea proceselor degenerative de la nivel articular.

5. MOD DE ACȚIUNE

Acționează sinergic prin ingredientele active conținute astfel:

Ingredient Activ Nutraceutic (ANI)	Anti-inflamator	Antioxidant	Anabolic	Anti-catabolic	Analgezic
Glucozamină HCl	✓		✓	✓	✓
Condroitină Sulfat	✓		✓	✓	✓
DEXAHAN®	✓	✓	✓	✓	✓
Acid Ascorbic		✓	✓		
Sulfat de Zinc		✓	✓		

6. MOD DE ADMINISTRARE

Capsulele se pot administra întregi sau desfăcute și presărate peste mâncare

Dozele recomandate variază în funcție de individ.

Dacă pisica tratată este într-o fază incipientă a bolii osteo-articulare, primește suplimentul articular preventiv, a primit anterior un alt supliment articular, manifestă durere și primește terapie anti-inflamatorie și analgezică suplimentară se vor administra dozele din programul de întreținere, respectiv 1 capsulă/zi pentru o pisică între 1 și 9 kg.

Dacă pisica tratată nu primește terapie suplimentară cu analgezice și/sau anti-inflamatorii și manifestă semne clinice datorate afecțiunilor osteo-articulare se recomandă doza de încărcare pentru 6 săptămâni, urmată de doza de întreținere până la vindecare sau a la long.

Dozele se pot ajusta la sfatul medicului veterinar.

Program inițial de încărcare – 6 săptămâni:

2 capsule pe zi (1 dimineața și 1 seara)

Se pot administra ca atare sau se pot desface și presăra peste mâncare

Program de Întreținere – pe termen lung:

doza zilnică poate fi reusă la :1 capsulă pe zi.

7. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Doar pentru uz veterinar

8. DEPOZITARE

15 – 25 °C. A nu se lăsa în lumina directă a soarelui.

9. GREUTATE NETĂ

63 g

10. MOD DE AMBALARE

Cutii cu 30 de capsule în blister

Bax: 3 x 1cutie x 30 capsule